



## NAPOTNICA ZA IMUNOPATOLOŠKO PREISKAVO

NALEPKA

<b>Napotna ustanova/oddelek:</b>	<b>Podatki o bolniku:</b>		
<b>Napotni zdravnik</b> (tiskane črke/žig in podpis, številka):	Priimek, ime: Datum rojstva: EMŠO: KZZ številka: Naslov:		
<b>Kontaktna tel. številka napotnega zdravnika:</b>			
<b>Obravnava:</b>			
<b>REDNA</b> <b>NUJNA</b>			
<b>Napotna diagnoza, klinični podatki :</b>			
<b>DOLOČITEV AVTOPROTITELES V SERUMU (označi):</b>			
	<b>SKICA</b>	<b>OPOMBA:</b>	
<b>ANCA</b> (protitelesa proti citoplazemskim antigenom nevtrofilnih granulocitov) <ul style="list-style-type: none"><li>- IIF na razmazu levkocitov (IgG, IgA, IgM)</li><li>- ELISA PR 3 (IgG)</li><li>- ELISA MPO (IgG)</li><li>- ELISA Panel (IgG): azurocidin, BPI, katepsin-G, elastaza, laktoferin, lizocim</li></ul>			
<b>ASCA</b> (protitelesa proti antigenom <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>- ELISA (IgA, IgG)</li></ul>			
<b>Anti-GBM PROTITELESA</b> (protitelesa proti antigenom glomerulne bazalne membrane) <ul style="list-style-type: none"><li>- IIF na normalni ledvici in biočipih alfa 3 verige kolagena IV (IgG, IgA)</li><li>- ELISA Alfa 3 veriga kolagena IV (IgG)</li></ul>			
<b>Anti-C1q PROTITELESA</b> (protitelesa proti komponenti kompleksa C1q) <ul style="list-style-type: none"><li>- ELISA C1q (IgG)</li></ul>			
<b>Anti-PLA2R PROTITELESA</b> (protitelesa proti receptorju za fosfolipazo A2) <ul style="list-style-type: none"><li>- ELISA PLA2R (IgG)</li></ul>			
<b>Anti-THSD7A PROTITELESA</b> (protitelesa proti trombospondinu tip-1 s proteinom 7A) <ul style="list-style-type: none"><li>- IIF na transficiranih celicah (IgG)</li></ul>			
<b>PROTITELESA PROTI ANTIGENOM KOŽE (PEMFIGUSNA, PEMFIGOIDNA, ...)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- IIF na normalni koži (IgG, IgA)</li><li>- IIF na razcepljeni koži (IgG, IgA)</li><li>- IIF na normalnem uroteliju (IgG)</li><li>- ELISA Desmoglein 1 (IgG), Desmoglein 3 (IgG)</li><li>- ELISA Envoplakin (IgG)</li><li>- ELISA BP180 (IgG), BP230 (IgG)</li><li>- ELISA Kolagen VII (IgG)</li><li>- ELISA Epidermalna transglutaminaza (IgA)</li></ul>			
<b>Vzorci odvzeti</b> (tiskano in podpis):	<b>Napotnico izpolnil</b> (tiskane črke/žig in podpis):		
<b>Čas odvzema</b> (datum, ura, minuta):			
<b>Čas odpošiljanja vzorcev</b> (datum, ura, minuta):			

**Datum in ura sprejema na Inštitut za patologijo:**  
(glej nalepko IP MF)

**Sprejel** (tiskane črke/žig in podpis):  
(glej nalepko IP MF)

**Opombe:**

## NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE NAPOTNICE

### Splošno

- Napotnico izpolnite v dvojniku
- Dvojnik lahko 1) zadržite za vašo evidenco ali 2) ga skupaj z originalom pošljite na Inštitut za patologijo; v tem primeru lahko a) kurir odnese dvojnik s potrdilom, da je bil vzorec sprejet, ali b) vrnemo dvojnik skupaj z izvidom
- Napotnico izpolnajte čitljivo
- Možno je izpolnjevanje elektronske oblike napotnice in tiskanje v dvojniku – elektronska oblika je dostopna na [www.mf.uni-lj.si/ipat](http://www.mf.uni-lj.si/ipat)

### Obravnav

- Označite **NUJNO**, če gre za nujno preiskavo

### Podatki o bolniku

- Obvezni podatki o bolniku so: Ime in priimek, Datum rojstva, Naslov in KZZ številka (po možnosti tudi EMŠO)
- Podatki so lahko na nalepki ali čitljivo izpisani

### Podatki o naročniku in posegu

- Obvezni podatki o naročniku so: Ustanova in oddelek (prejemnik izvida), Napotni zdravnik, Čas odvzema vzorcev ter Kontaktna telefonska številka napotnega zdravnika
- Potrebni so žig (ali čitljiv izpis) napotnega zdravnika ter podpis in številka zdravnika
- Napotni zdravnik je odgovorni zdravnik za naročeno preiskavo, ki prejme izvid preiskave

### Napotna diagnoza, klinični podatki in/ali namen (vrsta) preiskave

- Poleg napotne diagnoze (klinične diferencialne diagnoze) navedite ključne podatke, ki so pomembni za imunopatološko diagnostiko (obširnejše podatke je smiselno poslati v prilogi)

### Prejšnji imunoserološki/histo/citopatološki izvidi

- Navedite, ali je bila pri bolniku opravljena predhodna imunoserološka in/ali cito ali histopatološka preiskava
- Navedite čim več dostopnih podatkov o predhodnih izvidih

### Določitev avtoprotiteles v serumu

- Označite zelene preiskave

### Napotnico izpolnil

- Potreben je čitljiv izpis ali žig in podpis tistega, ki je napotnico izpolnil
- Praviloma napotnico izpolni napotni zdravnik
- Če napotnice ne izpolnjuje zdravnik, se podpiše oseba, ki jo je zdravnik pooblastil za izpolnjevanje napotnice (tudi v tem primeru nosi zdravnik vso odgovornost za pravilnost in popolnost podatkov na napotnici!)

### Datum in ura sprejema v laboratorij in podpis

- Izpolni Inštitut za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani
- Če rubriki nista izpolnjeni, glej nalepko IP MF; na kateri je naveden čas sprejema in za sprejem odgovorna laborant in administrator